PERFIL DE PREMATUROS NASCIDOS VIVOS EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DA BAHIA

Taynara Bispo Conceição¹; Luciano Marques dos Santos²

1. Voluntário PEVIC/CNPq, Graduando em Enfermagem, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail:

taynara_tatay@hotmail.com

2. Orientador, Departamento de saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail:

lucmarxenfo@yahoo.com.br

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Obstétrica. Trabalho de Parto prematuro. Recém-nascido prematuro.

INTRODUÇÃO

A prematuridade é representa um grande problema de Saúde Pública, pois acarreta às famílias e à sociedade em geral um custo social e financeiro de difícil mensuração, além de ser um determinante de morbimortalidade neonatal, principalmente em países em desenvolvimento. Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência dos partos prematuros é maior nos países pobres e atualmente está em torno de 12% maior do que em nações mais desenvolvidas (9%) (Ramos; Cuman, 2009; Howson; Kinney; Lawn, 2012).

Considerando a estatística de prematuros nascidos vivos, sabe-se que um percentual considerável dos neonatos pré-termo precisa de auxílio para iniciar a transição cardiorrespiratória para a adaptação à vida extrauterina. Dados da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais indicam que, em 2010, dos nascidos vivos prematuros de extremo baixo peso e sem malformações, 60% precisaram de ventilação com pressão positiva, dos quais 40% melhoraram com a ventilação por máscara facial e que aproximadamente 6% foram ventilados com cânula traqueal e receberam massagem cardíaca e/ou medicações na sala de parto (Brasil, 2012).

Assim, este estudo justifica-se em gerar conhecimento das características de um grupo populacional contribuindo para a redução dos índices dos indicadores de saúde, principalmente o coeficiente de mortalidade infantil. Esses dados alicerçarão, direcionarão e subsidiarão as ações propostas pelos diversos a assistência à saúde, bem como sua forma de execução. Portanto, uma avaliação contínua desses indicadores de saúde pelas administrações públicas forneceria estratégias para assistência integral à criança e instrumentos para redução da incidência de morbimortalidade infantil.

Diante disso, questiona-se: Qual o perfil de prematuros nascidos vivos em um município no interior da Bahia? Cujo o objetivo é identificar o perfil de recém-nascidos prematuros nascidos vivos em uma cidade do interior da Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, exploratório e quantitativo de caso controle, vinculado à pesquisa multicêntrica intitulada “Parto prematuro: estudo dos fatores associados para construção de estratégias de prevenção”, que foi realizada em quatro municípios brasileiros sendo dois no nordeste e dois na região sul. O estudo foi realizado

no município de Feira de Santana, Bahia, no Hospital Inácia Pinto dos Santos (HIPS), e no Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA).

A amostra do estudo multicêntrico foi estimada em 600 entrevistadas, divididas em 300 casos e 300 casos controles, tomando como base dados do município do Rio Grande, e pelo fato do Rio Grande do Sul ter o maior índice de prematuridade entre os estados brasileiros. Este cálculo foi realizado esperando uma prevalência de partos prematuros em torno de 12%, com o máximo de 10% de perdas. Para este estudo, foram utilizados os dados dos 333 casos, em particular, dos recém-nascidos prematuros. Portanto, não foram adotados critérios de inclusão e de exclusão.

Os dados foram coletados desde abril de 2014, com finalização em fevereiro de 2016. Para tanto, foi utilizado um formulário contendo informações relacionadas às condições sociodemográficas, reprodutivos, gestacionais, hábitos de vida e do recém-nascido prematuro. Foram consideradas como variáveis deste estudo: Sexo; Idade gestacional; Peso do nascimento; Apgar do primeiro minuto de vida; Apgar quinto minuto de vida; Necessidade de reanimação; Medidas utilizadas durante a reanimação; Necessidade de internamento; Local do internamento e Motivos da internação.

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e analisados através do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 15.0. Foram calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis.

Antes da coleta de dados, as puérperas foram informadas quanto aos riscos, benefícios, objetivos da pesquisa, quanto ao caráter voluntário de sua participação e da preservação do seu anonimato, mediante leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual assegurou os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. Este estudo respeita a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sendo devidamente aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande através do parecer de número 134/2013 e no CEP da UEFS através do parecer 643.668.

RESULTADOS

A análise dos dados quantitativos permitiu traçar o perfil dos recém-nascidos prematuros nascidos vivos e a necessidade dos mesmos da reanimação em sala de parto e a necessidade de cuidados intensivos ou semi-intensivos.

PERFIL DE PREMATUROS NASCIDOS VIVOS EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DA BAHIA.

De um total de 653 recém-nascidos internados no período estudado, 51,1% casos de nascidos vivos prematuros. De acordo com as variáveis relacionadas ao recém-nascido prematuro, 50,6% foram do sexo masculino, 55,3% tiveram baixo peso ao nascer (média de 2.091 kg), 77,7% Apgar maior do que 7 no primeiro minuto de vida (média de 7) e este mesmo valor do boletim no quinto minuto de vida em 93,0% dos casos investigados (média de 8) (Tabela 1). Com relação a idade gestacional com base pela DUM 47,2 (média de 34,3 semanas) foram classificados com moderado, e com base pela ecografia 46,9% (média de 33,7 semanas) e pelo método de Capurro 50,7% (média de 33,6 semanas) foram classificados com limítrofe respectivamente. (Tabela 1).

Tabela 1 – Características de prematuros nascidos vivos em dois hospitais públicos da cidade de Feira de Santana-Bahia de abril 2014 a novembro de 2015.

Variáveis	N (%)
Sexo (N=333)	
Masculino	168 (50,6%)
Feminino	164 (49,4%)
Peso ao Nascer (N=331*)	
Baixo Peso Extremo	19 (5,7%)
Muito Baixo Peso	46 (13,9%)
Baixo Peso ao nascer	183 (55,3%)
Peso Normal	83 (25,1%)
Apgar 1 (N=301*)	
<7	67 (22,3%)
≥7	234 (77,7%)
Apgar 5 (N=301*)	
<7	21 (7,0%)
≥7	280 (93,0%)
DUM (N=214*)	
Prematuro Extremo	21 (9,8%)
Moderado	92 (43,0%)
Limítrofe	101 (47,2%)
Ecografia (N=318*)	
Prematuro Extremo	32 (10,1%)
Moderado	149 (46,9%)
Limítrofe	137 (43,0%)
Método de Capurro (N=229*)	
Prematuro Extremo	25 (10,9%)
Moderado	116 (50,7%)
Limítrofe	88 (38,4%)

Fonte: Coleta de dados.

* As diferenças no total da amostra são decorrentes de dados ignorados que não foram encontrados no prontuário do recém-nascido ou materno, ou a entrevistada não soube/quis informar, ou não se aplicam a questão.

ASSISTÊNCIA IMEDIATA EM NASCIDOS VIVOS EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DA BAHIA.

No que se refere a assistência imediata no nascimento 60,5% dos recém-nascidos foram reanimados, sendo que 21% necessitaram de O₂ inalatório, 42,3% foram encaminhados para unidade de alojamento conjunto. Entretanto, 32,2% foram hospitalizados em unidade semi-intensiva neonatal e 25,5% em cuidados intensivos, sendo a disfunção respiratória o principal motivo de hospitalização nestas unidades neonatais (41,2%) (Tabela 2).

Tabela 2 – Perfil de prematuros nascidos vivos em dois hospitais públicos da cidade de Feira de Santana-Bahia de abril 2014 a novembro de 2015.

Variáveis	N (%)
Necessidade de Reanimação em sala de parto (N=332*)	
Sim	201 (60,5%)
Não	131 (39,5%)

Que atendimento necessitou em sala de parto	
(N=175*)	
O ₂ inalatório	70 (21,0%)
VPP por máscara	25 (7,5%)
VPP por TET	20 (6,0%)
Massagem cardíaca externa	4 (1,2%)
Drogas	4 (1,2%)
Outro	52 (15,7%)
Local de internação (N=333)	
Alojamento conjunto	141 (42,3%)
Semi-intensiva neonatal	107 (32,2%)
UTI Neonatal	85 (25,5%)
Motivo principal da internação	
(N=195*)	
Disfunção respiratória	137 (41,2%)
Outros	58 (17,6%)

Fonte: Coleta de dados.

* As diferenças no total da amostra são decorrentes de dados ignorados que não foram encontrados no prontuário do recém-nascido ou materno, ou a entrevistada não soube/quis informar, ou não se aplicam a questão.

DISCUSSÃO

Quanto às características dos prematuros nascidos vivos (Tabela 1), este estudo mostrou predomínio de nascimentos de prematuros do sexo masculino, apesar de que a questão de gênero não é significativa. A maioria dos estudos presentes na literatura apresenta maior registro de nascimentos pré-termo no sexo masculino (Piccoli et al., 2012; Drummond et al., 2014; Silva; Pelloso, 2009).

Quanto ao peso ao nascer constitui um dos pilares das variáveis de requisito para a sobrevivência infantil que, quando inferior a 2.500g é considerado um dos principais determinantes da mortalidade neonatal e da morbidade infantil (Rego et al., 2010). O peso do recém-nascido é estimado como fator decisivo para a análise do desenvolvimento pós-natal (Salge et al., 2009). Esse estudo demonstrou que 25.1% dos nascidos vivos prematuros apresentaram peso normal ao nascimento e 74.9% apresentaram baixo peso ao nascer (Tabela 1), ou seja, tiveram peso menor que 2.500g, o que identificam uma população de recém-nascidos com condições de saúde desfavoráveis, associadas às principais causas de morbimortalidade neonatal e infantil (Rego et al., 2010).

Com base na literatura, torna-se grande a preocupação para profissionais de saúde o baixo peso ao nascer, pois se associa à morbimortalidade neonatal e infantil. Os recém-nascidos com peso menor que 2.500g, podem ser justificadas de duas condições opostas, a prematuridade ou restrição do crescimento intrauterino, que podem ser causadas por diversos fatores inclusive redução da idade gestacional, esses fatores do baixo peso ao nascer, podem atuar de forma isolada ou sinérgica e em graus instáveis (Ramos; Cuman, 2009).

O índice de prematuridade desse estudo foi definido através idade gestacional, foi considerado essa variável em menos de 37 semanas para caracterizar os nascimentos prematuro, sendo analisada através da última data de menstruação (DUM), ecografia e método de capurro (Tabela 1).

Uma avaliação precisa da idade gestacional é primordial para tomar decisões sobre cuidados obstétricos que afetem o recém-nascido prematuro. Para obter a idade gestacional precisa e confiável em alguns casos, torna-se difícil devido a fatores, como a incerteza quanto à data da última menstruação e o início tardio do pré-natal, que alteram a idade gestacional baseada no cálculo pelo ultrassom (Mwamakamba; Zucchi, 2014). Isso dificultou a coleta de dados devido à falta dessas informações gerando números ignorados em nosso banco.

Neste estudo, uma das classificações da idade gestacional foi determinada com base no método de capurro, que atualmente não é o mais indicado, pois é avalia mais as características neurológicas do que as corpóreas somáticas. O ideal seria o escore de New Ballard, que consiste em exame físico e neurológico feito por neonatologistas nas primeiras 12 horas de vida. Esse teste foi considerado por haver um padrão previsível de mudanças ocorridas durante a gestação e por ser um teste preciso, quando comparado ao de capurro e outros (Mwamakamba; Zucchi, 2014).

Outra variável importante para avaliar no prematuro, é o índice de APGAR que é uma escala de risco que representa as condições clínicas do recém-nascido, de forma que caracterize e pontue de acordo com a presença da respiração, cor da pele, batimentos cardíacos, tônus musculares e resposta a estímulos (Oliveira; Moura; Silva, 2007). Esta escala foi criada na década de 1950, e sugeria que se o escore de um conceito permanecesse baixo aos cinco minutos de vida, existiria grande probabilidade de problemas neurológicos (Cremonese et al., 2012).

O índice de Apgar baixo é útil para identificar os recém-nascidos que necessitam de cuidados adicionais. Um índice de Apgar com nota maior que 7 significa que o bebê é saudável e sugere que não terá problemas futuros. Quando a nota for menor que 7 é sinal de alerta com alterações fisiopatológicas e maturidade do recém-nascido (Ramos; Cuman, 2009).

No que se refere ao índice de Apgar no primeiro minuto de vida, a pesquisa mostra que 22,3% nota insatisfatória (menor que 7), e apenas 7% obteve nota insatisfatória no quinto minuto de vida. Esse dado é interessante, pois mostra que, entre todos os prematuros, um percentual de 7% manteve o índice de Apgar insatisfatório. Isso revela que mesmo que tenham nascido com dificuldades, houve recuperação rápida na avaliação após 5 minutos, também indica um bom prognóstico e grandes chances de sobrevida. Também podemos dizer que 7% dos nascidos vivos tiveram a necessidade de atendimento de maior nível de complexidade e possíveis chances de complicações e sequelas. A classificação de um índice de Apgar inferior a 7 é indicativa de precariedade nas funções vitais do recém-nascido, havendo necessidade de intervenção imediata da equipe de saúde (Cremonese et al., 2012).

Com relação a necessidade de reanimação em prematuros, segundo a literatura observa-se uma importante influência da idade gestacional e do peso ao nascer em relação as condições dos recém-nascidos e na necessidade de reanimação neonatal. A necessidade de procedimentos de reanimação e índice de mortalidade é maior, quanto menor a idade gestacional e/ou peso ao nascer (Drummond et al., 2014).

Geralmente, 2 em cada 3 recém-nascidos com peso de nascimento menor que 1.500g precisam de reanimação. Um em cada 10 recém-nascidos necessita de ventilação com

pressão positiva para iniciar e/ou manter movimentos respiratórios efetivos; um em cada 100 neonatos precisa de intubação e/ou massagem cardíaca; e um em cada 1.000 requer intubação, massagem e medicações, desde que a ventilação seja aplicada adequadamente (Branco; Guinsburg, 2013).

O ato de reanimar um recém-nascido, principalmente os prematuros, não é livre de riscos. Há a possibilidade de complicações graves, tais como pneumotórax, hemotórax, fratura de costelas, entre outras, além de poder contribuir, de forma direta ou indireta, para o aumento na incidência de patologias tardias (Drummond et al., 2014).

Sabe-se que um percentual considerável dos prematuros precisou de auxílio para iniciar a transição cardiorrespiratória necessária para adaptar-se à vida extrauterina. Estima-se que, no país a cada ano, 300.000 crianças necessitem ajuda para iniciar e manter a respiração ao nascer e cerca de 25.000 prematuros de baixo peso precisem de assistência ventilatória na sala de parto (Branco; Guinsburg, 2013).

Segundo um documento científico do programa de reanimação neonatal da sociedade brasileira de pediatria, por ano no Brasil, cerca de 25 mil recém-nascidos de baixo peso extremo necessitam de assistência ventilatória adequada na sala de parto, sendo esta considerada como ponto crítico para o sucesso da reanimação neonatal, fazendo com que os pulmões do recém-nascido se inflam e, com isso haja dilatação da vasculatura pulmonar e hematóse apropriada. (Branco; Guinsburg, 2013).

A elevada necessidade de ajuda para iniciar a respiração efetiva em sala de parto, ou seja, efetuar a transição para o ambiente extrauterino, e de reanimação propriamente dita nos neonatos pré-termo se deve, de modo geral, à sua imaturidade anatômica e fisiológica (Branco; Guinsburg, 2013). Portanto, nota-se a que necessidade de ventilação com pressão positiva e manobras avançadas de reanimação na sala de parto, é bastante frequente em prematuros, especialmente naqueles de extremo baixo peso.

Dentre os prematuros do estudo que necessitaram de atendimento em sala de parto, 42,3% foram hospitalizados em unidade de alojamento conjunto, 32,2% em unidade semi-intensiva neonatal e 25,5% em cuidados intensivos. A hospitalização é necessária para acompanhar e ter cuidados demasiados. No hospital estudado, a internação em unidade alojamento conjunto é de rotina para o recém-nascido e sua mãe, onde permanece durante 2 dias e recebem alta em seguida.

Aos que foram internados em unidades de cuidados intensivos e semi-intensivos, os motivos desta hospitalização variavam de disfunção respiratória (41,2%), hipoglicemia (1,5%), icterícia (2,7%), infecção perinatal (1,2 %), insuficiência cardíaca (0,9%), entre outros (11,3%), sendo a disfunção respiratória o principal motivo das internações.

Dificuldades adaptativas que recém-nascido prematuro apresenta, destaca-se suscetibilidade aumentada ao estresse oxidativo e às infecções, o que facilita o aparecimento de morbidades que contribuem para a mortalidade neonatal desse grupo de pacientes (Almeida et al., 2010).

A disfunção respiratória apresentada na maioria dos prematuros, justifica a necessidade do O₂ inalatório em sala de parto e em alguns casos da ventilação por pressão positiva. A literatura aponta que ao nascimento, o prematuro frequentemente tem uma deficiência respiratória, requerendo uma ventilação mecânica através de tubos nasotraqueais ou orotraqueais (Salge et al., 2009).

A reanimação ao nascimento é uma das oito intervenções estratégicas para diminuir a mortalidade infantil em nível mundial. Para recepcionar recém-nascidos neste período crítico, onde a chance de óbito ou morbidade é alta, é essencial contar com equipamentos apropriados e uma equipe qualificada e capacitada a realizar de forma rápida e efetiva os procedimentos avançados de reanimação, de acordo com o estado da arte no que tange aos conhecimentos existentes (Branco; Guinsburg, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo proporcionou o identificar o perfil dos recém-nascidos prematuros do município de Feira de Santana, Bahia. Estes resultados apontam a necessidade de preparação de profissionais a nível de conhecimento e cuidados clínicos avançados, para planejamento de medidas eficazes para reduzir complicações ao nascimento e também serem capacitados, a ponto de saber lidar com a prematuridade.

Os dados deste estudo evidenciaram as consequências imediatas da prematuridade para os recém-nascidos ao revelar os escores de Apgar e baixo peso ao nascimento. Reconhecer o prognóstico das variáveis de desenvolvimento dos prematuros, pois prematuros cada vez menores e mais imaturos impõe o questionamento quanto à qualidade de sua vida futura.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M.F.; GUINSBURG, R.; COSTA, J.O.; ANCHIETA, L.M.; FREIRE, L.M.; CAMPOS, D. JR. 2010. Non-urgent caesarean delivery increases the need for ventilation at birth in term newborn infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed; 95(5):F326-30.
- BRANCO, M.F.; GUINSBURG, R. 2013. Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria: Condutas. São Paulo: SBP.
- BRASIL. Ministério da Saúde. 2012. O Brasil está entre os dez países com o maior número de partos prematuros, aponta OMS.
- CREMONESE, C.; FREIRE, C.; MEYER, A.; KOIFMAN, S. 2012. Exposição a agrotóxicos e eventos adversos na gravidez no Sul do Brasil, 1996-2000. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 28(7):1263-1272, jul.
- DRUMMOND, S.; SOUZA, T.S.; LIMA, F.G.; VIEIRA, A.A. 2014. Correlação entre o uso de corticoterapia antenatal, a reanimação e a mortalidade de recém-nascidos prematuros de muito baixo peso. Rev Bras Ginecol Obstet. 36(5):211-5.
- HOWSON, C.P.; KINNEY, M.V.; LAWN, J.E. March of Dimes, PMNCH, Save the Children, WHO. Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth. World Health Organization. Geneva, 2012.
- MWAMAKAMBA, L.W.; ZUCCHI, P. 2014. Estimativa de custo de permanência hospitalar para recém-nascidos prematuros de mães adolescentes em um hospital público brasileiro. einstein. 12(2):223-9.
- OLIVEIRA, N.C.; MOURA, E.R.F.; SILVA, C.F. 2007. Perfil dos nascidos vivos de maranguape-ce: a partir da série histórica de 2000 a 2003 Rev. RENE. Fortaleza, v. 8, n. 1, p. 52-59, jan./abr.
- PICCOLI, A.; SOARES, C.R.S.; COSTA, G.; SILVEIRA, J.L.; FIATT, M.P.; CUNHA, R.S. 2012. Perfil clínico de neonatos de muito baixo peso, internados em uma Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. Revista HCPA;32(4):412-419.
- RAMOS, H.A.C.; CUMAN, R.K.N. 2009. Fatores de risco para prematuridade: pesquisa documental. Esc Anna Nery Rev Enferm; abr-jun; 13 (2): 297-304.

REGO, M.A.S.; FRANÇA, E.B.; TRAVASSOS, A.P.A; BARROS, F.C. 2010. Avaliação do perfil de nascimentos e óbitos em hospital de referência. *Jornal de Pediatria* - Vol. 86, Nº 4.

SALGE, A.K.M.; VIEIRA, A.V.C.; AGUIAR, A.K.A.; LOBO, S.F.; XAVIER, R.M.; ZATTA, L.T.; CORREA, R.R.M.; SIQUEIRA, K.M.; GUIMARÃES, J.V.; ROCHA, K.M.N.; CHINEM, B.M.; SILVA, R.C.R. 2009. Fatores maternos e neonatais associados à prematuridade. *Rev. Eletr. Enf.* [Internet];11(3):642-6.

SILVA, G.F; PELLOSO, S.M. 2009. Perfil das parturientes e seus recém-nascidos atendidos em um hospital-escolas do Noroeste do Estado do Paraná. *Rev Esc Enferm USP*; 43(1):95-102