Flora da Bahia: Violaceae e estudos taxonômicos no gênero *Paypayrola* Aubl.

Filipe Gomes dos Anjos Oliveira¹, José Florencio Cerqueira Oliveira²; Luciano Paganucci de Queiroz³

1, 2. Bolsista PIBIC/CNPq, Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail:

filipegomes335@gmail.com, jose.florencioco@gmail.com

3. Professor Dr. Do Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail:

luciano.paganucci@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: Taxonomia; Florística; Malpighiales.

INTRODUÇÃO

Violaceae possui distribuição cosmopolita e inclui 23 gêneros e cerca de 800 espécies. No Brasil ocorrem 14 gêneros e cerca de 80 espécies, a maioria em *Pombalia* Vand. e *Rinorea* Aubl. (Souza e Lorenzi 2012; Paula-Souza, 2009).

As Violaceae são ervas, árvores ou, menos frequentemente, lianas com folhas alternas espiraladas ou dísticas ou, menos frequentemente, opostas, simples, com estípulas conspicuas, persistentes ou caducas, raramente com pontuações translúcidas (*Leonia* Ruiz & Pav.), inflorescência em pseudoracemo, racemo, cimeira simples ou composta, fascículo ou flores solitárias, flores geralmente bissexuadas, actinomorfas a fortemente zigomorfas, diclamídeas, cálice pentâmero, dialissépalo, persistente na frutificação, imbricado, labelo (pétala abaxial) giboso a longamente calcarado nas flores zigomorfas, estames (3-)5, filetes livres ou unidos entre si, anteras rimosas, geralmente com conectivo provido de um apêndice membranáceo e apical (em algumas espécies os dois estames anteriores, são provido de apêndices nectaríferos sobre os filetes), ovário súpero, (2-)3(-5)-carpelar, unilocular, placentação parietal, uni a pluriovulado, fruto cápsula, às vezes membranácea e inflada (*Anchietea* e *Hybanthopsis*), raramente baga (*Gloeospermum* Triana & Planch. e *Leonia*) ou noz (*Leonia*) (Souza & Lorenzi 2012).

A família tradicionalmente é dividida em três subfamílias (Hekking 1988): Leonioideae, com flores actinomorfas, prefloração irregularmente imbricada, representada apenas pelo gênero sul-americano *Leonia*; Violoideae, com flores actinomorfas ou zigomorfas, prefloração coclear distal ou quincuncial e Fuispermoideae, com flores actinomorfas, prefloração convoluta, representada pelo gênero *Fuispermum* Cuatrec. Paula-Souza (2009) realizou estudos filogenéticos na tribo Violeae e observou que Violoideae não é monofilética. Nesse mesmo trabalho também foi constatado o não monofiletismo de *Hybanthus* o que levou ao restabelecimento de *Pombalia* (Paula-Souza 2014), transferindo assim para este último gênero várias espécies listadas para a Bahia. No entanto, algumas espécies foram mantidas em *Hybanthus* mesmo apresentando características que sustentariam sua transferência para *Pombalia*. Essa mesma autora aponta a necessidade de uma melhor diferenciação entre *Pombalia* e *Hybanthus* (Paula-Souza 2009).

Apesar dos avanços no conhecimento da família, não existe um estudo taxonômico para o gênero *Paypayrola*, o que resulta em muitas confusões quanto a delimitação das espécies, sendo este o principal objetivo do presente trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas expedições para amostragem das espécies nativas da Bahia, especialmente os gêneros mal representados nos herbários. Foram priorizadas viagens para municípios onde havia informação de presença de espécies pouco coletadas, tendo sido selecionadas municípios da Chapada Diamantina (Abaíra, Catolés, Ituaçu e Tanhaçu).

Foram analisadas as coleções dos principais herbários da Bahia (ALCB, CEPEC, HUEFS). Tipos nomenclaturais de táxons da Bahia foram analisados através de imagens disponibilizadas na internet, especialmente no site do JStor Plant Science (<http://plants.jstor.org>), do Species Link (<http://splink.cria.org.br/>) e do Re flora (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).

As espécies foram identificadas através da análise das obras príncipes e comparação com imagens dos tipos nomenclaturais disponíveis. As descrições morfológicas foram feitas com base em espécimes coletados na Bahia. Eventualmente, espécimes coletados fora do estado poderão ser usados para complementar a descrição de partes ausentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Bahia foram catalogados nove gêneros e 25 espécies. O maior gênero é *Pombalia*, com doze espécies: *P. arenaria* (Ule) Paula-Souza, *P. atropurpurea* (A.St.-Hil.) Paula-Souza, *P. barbata* Paula-Souza, *P. brevicaulis* (Mart.) Paula-Souza, *P. calceolaria* (L.) Paula-Souza, *P. communis* (A.St.-Hil.) Paula-Souza, *P. glauca* (Chodat) Paula-Souza, *P. heterosepala* (Eichler) Paula-Souza, *P. lanata* (A.St.-Hil.) Paula-Souza, *P. oppositifolia* (L.) Paula-Souza, *P. setigera* (A.St.-Hil.) Paula-Souza, *P. verrucosa* (Paula-Souza) Paula-Souza. Os demais gêneros encontrados na Bahia são: *Amphirrhox* Spreng. (1 espécie), *Anchietea* A.St.-Hil. (3), *Hybanthopsis* Paula-Souza (1), *Hybanthus* Jacq. (1), *Noisettia* Kunth (1), *Paypayrola* Aubl. (2), *Rinorea* Aubl. (3), *Schweiggeria* Spreng. (1). *Anchietea ferrucciae* Paula-Souza & Zmarzty e *Pombalia heterosepala* são endêmicas da Bahia. *Hybanthopsis bahiensis* Paula-Souza, anteriormente considerada endêmica da Bahia, foi recentemente registrada para a Serra da Guia no estado de Sergipe.

Os estudos taxonômicos no gênero *Paypayrola* ainda se encontram em processo de conclusão. Porém, as análises realizadas neste período indicam que *Paypayrola* conta com oito espécies: *Paypayrola arenacea* Aymard & G.A. Romero, *Paypayrola blanchetiana* Tul., *Paypayrola confertiflora* Tul., *Paypayrola glazioviana* Taub., *Paypayrola grandiflora* Tul., *Paypayrola guianensis* Aubl., *Paypayrola hulkiana* Pulle., *Paypayrola longifolia* Tul.

Chave para os Gêneros de Violaceae da Bahia

1. Hábito não arbóreo; flores claramente zigomorfas
 2. Arbusto escandente
 3. Trepadeiras; folhas com base cordada; sementes pilosas com duas projeções na base.....***Hybanthopsis***
 3. Lianas; folhas com base aguda a cuneada; sementes glabras sem projeções na base ***Anchietea***
 - 2'. Erva; arbusto ou subarbusto

- 4. Três sépalas externas e duas internas; estigma trilobado (sendo um dos lobos pouco visível) *Schweiggeria*
- 4'. Todas as sépalas externas; estigma simples
 - 5. Inflorescência em fascículos axilares *Noisetia*
 - 5'. Inflorescência dispostas de outra forma
 - 6. Papilas na face abaxial das folhas, gineceu e androceu *Hybanthus*
 - 6'. Papilas ausentes em toda a planta..... *Pombalia*
- 1'. Hábito arbóreo; flores actinomorfas ou levemente zigomorfas
 - 7. Flores não tubulares; estames livres entre si, raramente fundidos na base *Rinorea*
 - 7'. Flores tubulares; estames fundidos na base
 - 8. Inflorescência em dicásio; estilete maior que 5 mm compr.; apêndice do conectivo afilado no ápice da antera (cerca de 2 mm compr.)..... *Amphirrhox*
 - 8'. Inflorescência racemosa; estilete menor que 4 mm compr.; apêndice do conectivo retangular no ápice da antera (ca. 1 mm compr.) *Paypayrola*

Figura 1: Espécies de Violaceae da Bahia. **A** – *Noisetia orchidiflora*; **B** – *Paypayrola blanchetiana*; **C** – *Pombalia arenaria*; **D** – *Pombalia glauca*. Foto A: Lucas Marinho; Foto B: Moabe Fernandes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A família Violaceae apresenta ampla distribuição no estado da Bahia, tendo o gênero *Pombalia* o maior número de representantes no estado. Ainda se fazem necessárias excursões botânicas para amostragem das espécies pouco representadas em herbários. Maiores estudos ainda devem ser realizados para a delimitação das espécies presentes no gênero *Paypayrola*.

REFERÊNCIAS

- Aymard-C, G. et al. 2014. *Paypayrola arenacea* (Violaceae), a new species with an unusual life-form from a white sand savanna in the Amazon river basin of Venezuela. *Harvard Papers in Botany*. Vol. 19, No. 2, pp. 175–184.
- Hekking, W. H. A. 1988. Monograph 46. Violaceae Part I – *Rinorea* and *Rinoreocarpus*. Flora Neotropica Monograph 26: 1-207.
- Paula-Souza, J. 2003. Levantamento das espécies de *Hybantus* Jacq. (Violaceae) do Brasil. (Mestrado). Univ. São Paulo.
- Paula-Souza, J. 2009. Estudos Filogenéticos em Violaceae com ênfase na Tribo Violeae e Revisão Taxonômica dos Gêneros Lianescentes de Violaceae na região Neotropical. (Doutorado). Univ. São Paulo. 259p.
- Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2012. *Botânica Sistemática: guia ilustrativo para identificação das famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II*. 3ª ed. 768p.