**FLORA DA BAHIA: LEGUMINOSAE – VIGNA (PAPILIONOIDEAE) –
ESTUDO TAXONÔMICO DO GÊNERO NA BAHIA**
Kleber de Araujo Soares¹; Luciano Paganucci de Queiroz²; Cristiane Snak³

1. Bolsista PROBIC, Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: klebersoaresff@gmail.com
2. Orientador, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: luciano.paganucci@gmail.com
3. Coorientadora, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: cristianesnak@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: Flora; Phaseolineae; Taxonomia.

INTRODUÇÃO

A família Leguminosae, com cerca de 19.500 espécies e 770 gêneros (Lewis *et al.*, 2005; LPWG, 2013) atualmente é dividida em seis subfamílias, sendo Papilionoideae a de maior representatividade quanto ao número de espécies, com de 14.000 (LPWG, 2017).

Vigna Savi (Phaseoleae, Phaseolinae) sempre foi um gênero de delimitação complicada, devido à sua relação com *Phaseolus* e *Dolichos* (Marechal *et al.* 1978). Delgado-Salinas *et al.* (2011) segregaram *Vigna sensu lato* em sete gêneros: *Ancistrotropis*, *Cochliasanthus*, *Condylotylis*, *Helicotropis*, *Leptospron*, *Sigmoidotropis* e *Vigna sensu stricto*. Dentre as espécies ocorrendo na Bahia, *V. halophila* (Piper) possui posição taxonômica confusa, por apresentar caracteres de *Sigmoidotropis*, principalmente sua carena sigmoide e legume comprimido lateralmente, o que torna necessário um estudo filogenético para definir sua posição taxonômica.

Assim como outros gêneros das Phaseolinae, espécies de *Vigna* podem apresentar projeções carnosas (calosidades) no estandarte, com morfologia variando entre espécies. Maréchal *et al.* (1978), apresentam ilustrações de calosidades dos grupos de Phaseoleae, porém, ilustrações focadas em *Vigna*, podem apresentar valor taxonômico.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados levantamentos bibliográficos, além de visitas a herbários da Bahia (ALCB, CEPEC, HURB, HUEFS). A identificação das espécies foi realizada com base em literatura publicada, além de consultar os tipos nomenclaturais e obras príncipes das espécies da Bahia e seus sinônimos.

Para observação das calosidades do estandarte foi utilizada uma amostra por espécie de coletas da Bahia, utilizando microscópio estereoscópico para visualizar presença, posição e morfologia e ilustradas com caneta nanquim.

Para definição da posição filogenética de *Vigna halophila* foi feita amplificação de DNA genômico em PCR (reação em cadeia da polimerase) utilizando o kit TopTaq Master (QIAGEN). As amostras foram amplificadas utilizando termociclador em seguida foram submetidas a eletroforese em gel de agarose (1%).

As amostras foram então enviadas à Fiocruz Bahia para sequenciamento de nucleotídeos. As sequências obtidas foram editadas e alinhadas utilizando o programa Geneious 4.8. Sequências das demais espécies de *Vigna* e gêneros próximos foram obtidas do trabalho de Delgado-Salinas *et al.* (2011), disponíveis no TreeBase

(<https://treebase.org/>). Foram conduzidas análises baseadas em máxima parcimônia e em inferência Bayesiana.

RESULTADOS

- **Taxonomia.**

Vigna Savi, Nuov. Giorn. Lett. ser. 3. 8: 113. 1824.

Ervas, prostradas ou volúveis, tricomas uncinados ausentes; estípulas prolongadas além do ponto de inserção ou não. **Folhas** trifolioladas, folíolo terminal geralmente mais largo que os laterais. **Inflorescência** em pseudoracemos axilares; brácteas ovais a lanceoladas, geralmente caducas. **Flor** zigomorfa ou assimétrica; cálice campanulado, 4–5-laciniado; pétalas amarelas, brancas ou lilás a violetas, estandarte oblongo a orbicular, com ápice frequentemente retuso, auriculado na base; alas obovais ou alongadas, com um esporão na base; pétalas da carena planas, em forma de gancho, sigmoide ou lateralmente torcidas; estames 10, diadelfos, o vexilar com espessamento na base; disco nectarífero anelar; ovário sésil, estilete engrossado na porção distal, estigma terminal ou lateral. **Legume** frequentemente linear, reto ou falcado. **Sementes** reniformes, oblongas, arredondadas a cilíndricas.

No Brasil, o gênero é representado por 10 espécies, nos domínios da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (Snak & Delgado-Salinas, 2018). Na Bahia, o gênero é representado por quatro espécies: *Vigna luteola*, *V. marina*, *V. trichocarpa* e *V. vexillata*, em domínios de Mata Atlântica e Caatinga, sendo mais comuns em áreas litorâneas ou beira de estradas.

Chave de identificação das espécies

1. Corola branca a lilás, estandarte maior que 2 cm compr. com calosidades lineares na lâmina**4. *Vigna vexillata***
- 1'. Corola amarela, estandarte menor que 2 cm compr. com calosidades sigmoides ou ausentes na lâmina.
 2. Carena lateralmente torcida; estípulas maiores do que 6 mm compr., prolongadas abaixo do ponto de inserção; cálice 5-laciniado; estigma terminal; legume estreito-elíptico com ápice atenuado**3. *V. trichocarpa***
 - 2'. Carena plana, estípulas menores que 4 mm compr., não prolongadas abaixo do ponto de inserção, cálice 4-laciniado, estigma inserido lateralmente, legumes lineares a falcados com ápice caudado.
 3. Ramos glabros; folíolos cartáceos obovais a oblongos; lacínia vexilar do cálice bífida com ápice levemente retuso**2. *V. marina***
 - 3'. Ramos pubescentes; folíolos membranáceos lanceolados; lacínia vexilar do cálice deltoide com ápice agudo**1. *V. luteola***

- **Calosidades do Estandarte**

Dentre as quatro espécies encontradas na Bahia, *Vigna luteola*, *V. marina* e *V. vexillata* apresentam calosidades na lâmina do estandarte, com posições semelhantes e dois morfotipos, ocorrendo em pares próximos à linha mediana da lâmina,

simetricamente. *Vigna luteola* e *V. marina* apresentam um par com forma sigmoide de ca. 1,5 mm e 1,9 mm de comprimento, respectivamente. *V. vexillata* possui um par de calosidades lineares inclinadas para o centro, com ca. 2 mm de comprimento (Figura 1). *V. trichocarpa* não apresenta calosidades no estandarte.

Figura 1. Ilustrações das calosidades do estandarte das espécies de *Vigna* da Bahia. (A) *Vigna luteola*, (B) *V. marina*, (C) *V. vexillata*.

- **Posição taxonômica de *V. halophila***

Figura 2. Posição taxonômica dos acessos de *Vigna halophila* para ITS com análises de Máxima Parcimônia e Inferência Bayesiana. Valores de Bootstrap (inferiores) e de Probabilidade Posterior (superiores).

As análises filogenéticas de Máxima Parcimônia e Inferência Bayesiana do marcador nuclear ITS (Internal Transcribed Spacer) mostraram que os acessos de *V. halophila* emergem com alto suporte entre as espécies de *Sigmoidotropis* (1 PP, 88 BS), com um acesso mais relacionado à *S. spixiana* e outros dois se posicionando como grupo irmão deste (Figura 2).

Sigmoidotropis spixiana possui folíolos membranáceos ovados a deltoides com leves lobações nas margens, estípulas ovadas a deltoides, não prolongadas além do ponto de inserção, cálice 4-laciniado com a lacínia vexilar bífida e corola lilás, com seu tipo tendo sido coletado no Piauí. *Vigna halophila* apresenta todas essas características, com seu tipo coletado na Bahia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo das calosidades do estandarte se mostra um caráter morfológico de valor taxonômico pela distinção de formas e quanto à presença ou ausência, como no caso de *Vigna halophila* e *V. trichocarpa* que não possuem calosidades. Ainda assim, *V. luteola* e *V. marina*, possuem calosidades com mesma forma e tamanho semelhante, o que torna difícil distingui-las utilizando este caráter.

Com a dificuldade de distinguir o morfotipo de *V. halophila* das espécies de *Sigmoidotropis* e com os resultados da análise filogenética que mostra com alto suporte muita proximidade dos acessos com este gênero, *V. halophila* provavelmente será combinada em *Sigmoidotropis*, incluindo possibilidade de sinonimização em *S. spixiana*, mas para isso, mais estudos estão sendo desenvolvidos sobre a morfologia, e mais acessos incluídos nas análises filogenéticas. Por este motivo, a espécie não foi inserida no tratamento de *Vigna* para a Flora da Bahia.

REFERÊNCIAS

- DELGADO-SALINAS, A., THULIN, M., PASQUET, R., WEEDEN, N. & LAVIN, M. 2011. *Vigna* (Leguminosae) sensu lato: The names and identities of the American segregate genera. *Am. J. Bot.* 98: 1694-1715.
- LEWIS, G.P., SCHIRIRE, B.D., MACKINDER, B.A. & LOCK, M. [eds.]. 2005. *Legumes of the World*. Royal Botanic Gardens, Kew. 592 pp.
- LPWG [Legume Phylogeny Working Group]. 2013. Legume phylogeny and classification in the 21st century: Progress, prospects and lessons for the other species-rich clades. *Taxon* 62: 217-248.
- LPWG [Legume Phylogeny Working Group]. 2017. A new subfamily classification of the Leguminosae based on a taxonomically comprehensive phylogeny. *Taxon* 66: 44-77.
- MARÉCHAL, R., MASCHERPA, J. & STAINIER, F. 1978. Etude taxonomique d'un groupe complexe d'espèces des genres *Phaseolus* et *Vigna* (Papilionaceae) sur la base de données morphologiques et polliniques, traitées par l'analyse informatique. *Boissiera* 28: 1-273.
- SNACK, C & DELGADO-SALINAS, A.O. 2018. *Vigna* in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB29905>>. Acesso em: 3 ago 2018.